

ЭНМГ верхних конечностей от 23,04,25 Снижение СРВ, удлинение резидуальной и дистальной латентностей (срединный нерв слева) - слева: дист. срединная сенсо-моторная невропатия с блоком проведения на уровне запястья\ карпальный канал\ и локтевая, преимущественно сенсорная, невропатия справа: срединная сенсо-моторная невропатия и локтевая мото-сенсорная невропатия с блоком проведения на уровне кубитального канала

Консультация невролога: Синдром запястного канала с обеих сторон, субкомпенсация.. ДОО лучезапястных суставов? Эссенциальный тремор. Рекомендовано: нейромидин 20 мг *2 раза в день — 1 месяц, цитофлавин 2 т * 2 раза в день — 1 месяц.

Лечение: в\в стр дексаметазон, в\в капельно + физ.р-р + магнезия, будесонид через небулайзер, амброксол, ипратропия бромид + фенотерол через небулайзер, омега-3, лозартан, индапамид, фуросемид, преднизолон, ФТЛ. ЛФК

Выписывается в удовлетворительном состоянии, Б\лист не требуется.

Рекомендовано:

1. Диспансерное наблюдение у терапевта по месту жительства
2. Консультация МСЭ, группа инвалидности.
3. Вакцинация пневмококковой вакциной 1 раз в 5 лет, ежегодно от гриппа
4. Преднизолон 5 мг 4 таб утром - 5 дней, далее 3 таб -7 дней, далее 2 таб -7 дней, далее 1 таб 7 дней и отменить. Омега-3 20 мг за 30 мин до еды на период приема преднизолона.
- ✓ 5. Базисная терапия бронхиальной астмы: будесонид +формотерол 160/4,5 мкг 2 дозы 2 раза в день постоянно + тиотропия бромид 2,5 мкг\доза — 2 дозы постоянно. Полоскать рот водой после ингаляций.
- ✓ 6. Ипратропия бромид + фенотерол (Беродуал или аналоги) 20\50 мкг\доза по 1 -2 дозы по потребности не более 8 доз в сутки.
7. При обострении дополнительно через небулайзер: Будесонид (Пульмикорт или пульмибуд) 1000мкг + 2 мл физ-ра 1 раз в день * 1 раз в день + Ипратропия бромид + фенотерол (беродуал и другие) 0,25/0,5 мг\мл 15-20 капель + 2 мл. физ.раствора 2 раза в день — 7-10 дней. Полоскать рот водой после ингаляций.
8. Гипотензивная терапия под контролем АД: индапамид ретард 1,25 мг утром + лозартан 50 мг *1 раз в день под контролем АД.
9. Рекомендации невролога. нейромидин 20 мг *2 раза в день — 1 месяц, цитофлавин 2 т * 2 раза в день — 1 месяц. Рентгенограмма кистей в 2 проекциях с захватом лучезапястных суставов с обеих сторон.
10. Осмотр у областного пульмонолога через 6-12 месяцев.

Зав отделением Смирнова О.Л.

Лечащий врач Калугина А.А.

